

대두황권

(大豆黃卷)

Glycine Semen Germinatum

이 약은 콩 *Glycine max* Merrill (콩과 Leguminosae)의 잘 익은 씨를 받아 시킨 것이다.

성 상 이 약은 잘 익을 씨를 받아시킨 것으로 타원모양이며 납작하고 길이 8 ~ 12 mm, 지름 5 ~ 7 mm이다. 바깥 면은 노란색 또는 흑갈색으로 약간 쭈그러졌고, 배꼽점이 뚜렷하다. 씨껍질은 대개 갈라져 있으며, 때로는 부서져 있거나 탈락되어 있다. 떡잎은 황백색으로 두껍다. 배근(胚根)은 길이 5 ~ 10 mm로 가늘고 길며, 약간 구부러져 있고, 씨껍질 밖으로 나와 있다.

이 약은 냄새가 없고 씹으면 콩비린 맛이 있다.

순도시험 1) 중금속 가) 납 5 ppm 이하.

나) 비소 3 ppm 이하.

다) 수은 0.2 ppm 이하.

라) 카드뮴 0.3 ppm 이하.

2) 잔류농약 가) 총 디디티(p,p'-DDD, p,p'-DDE, o,p'-DDT 및 p,p'-DDT의 합) 0.1 ppm 이하.

나) 디엘드린 0.01 ppm 이하.

다) 총 비에이치씨(α,β,γ 및 δ -BHC의 합) 0.2 ppm 이하.

라) 알드린 0.01 ppm 이하.

마) 엔드린 0.01 ppm 이하.

건조감량 10.0 % 이하.

회 분 10.0 % 이하.

산불용성회분 5.0 % 이하.

엑스함량 물은에탄올엑스 6.0 % 이상.

저 장 법 밀폐용기.