

저령
(猪苓)

Polyporus Sclerotium

Polyporus

이 약은 저령 (猪苓) *Polyporus umbellatus* Fries (구멍장이버섯과 Polyporaceae)의 균핵이다.

성상 이 약은 균핵으로 막대 모양, 원형에 가까운 모양 또는 납작한 덩어리 모양이고 가지가 갈린 것도 있으며, 길이 5 ~ 25 cm, 지름 2 ~ 6 cm이다. 바깥면은 검은색, 회색 또는 흑갈색이고 쭈글쭈글 하거나 혹모양의 돌기가 있다. 몸체는 가볍고 질은 단단하다. 잘린 면은 흰색에 가깝거나 황백색이고 대개 과립 모양이다.

이 약은 냄새와 맛이 없다.

확인시험 이 약의 가루 0.5 g을 달아 아세톤 5 mL를 넣고 수욕에서 흔들어 섞으면서 2 분 간 가온한 다음 여과한다. 여액을 증발건고하고 잔류물에 아세트산탈수물 5 방울을 넣어 녹이고 황산 1 방울을 넣을 때 액은 적자색을 띠며 곧 어두운 녹색이 된다.

순도시험 1) 중금속 가) 납 5 ppm 이하.

나) 비소 3 ppm 이하.

다) 수은 0.2 ppm 이하.

라) 카드뮴 1.0 ppm 이하.

2) 잔류농약 가) 총 디디티(p,p'-DDD, p,p'-DDE, o,p'-DDT 및 p,p'-DDT의 합) 0.1 ppm 이하.

나) 디엘드린 0.01 ppm 이하.

다) 총 비에이치씨(α , β , γ 및 δ -BHC의 합) 0.2 ppm 이하.

라) 알드린 0.01 ppm 이하.

마) 엔드린 0.01 ppm 이하.

3) 이산화황 30 ppm 이하.

회분 16.0 % 이하.

산불용성회분 4.0 % 이하.

저장법 밀폐용기.