

종려피
(棕櫚皮)

Trachycarpi Petiolus

이 약은 종려(棕櫚) *Trachycarpus fortunei* Wendland 또는 기타 동속식물 (야자과 Palmae)의 잎자루가 오래 묵어 이루어진 헛줄기의 겉껍질이다.

성상 이 약은 잎자루로 긴 원뿔 또는 판 모양이며 길이 20 ~ 30 cm 이고 두께는 고르지 않다. 바깥면은 진한 갈색이며 거친 세로줄이 있다. 한 쪽 면은 모서리모양으로 뚜렷이 돌출하고 모서리 양쪽에는 갈색의 융모가 덮여 있다. 질은 단단하면서 질기고 잘 꺾이지 않는다. 꺾인 면은 섬유질이다.

이 약은 냄새가 거의 없고 맛은 떫다.

확인시험 이 약의 가루 0.5 g을 달아 물 10 mL를 넣고 잘 흔들어서 섞은 다음 여과한 여액에 염화철(III)시액 1 ~ 2 방울을 넣을 때 액은 어두운 보라색을 나타낸다.

순도시험 1) 중금속 가) 납 5 ppm 이하.

나) 비소 3 ppm 이하.

다) 수은 0.2 ppm 이하.

라) 카드뮴 0.3 ppm 이하.

2) 잔류농약 가) 총 디디티(총 DDT : p,p'-DDD, p,p'-DDE, o,p'-DDT 및 p,p'-DDT의 합계) 0.1 ppm 이하.

나) 디엘드린(Dieldrin) 0.01 ppm 이하.

다) 총 비에이치씨(총 BHC : α,β,γ 및 δ-BHC의 합계) 0.2 ppm 이하.

라) 알드린(Aldrin) 0.01 ppm 이하.

마) 엔드린(Endrin) 0.01 ppm 이하.

저장법 밀폐용기.