

학슬
(鶴虱)

Carpesii Fructus

이 약은 담배풀 *Carpesium abrotanoides* Linné (국화과 Compositae)의 열매이다.

성 상 이 약은 열매로 가는 원기둥모양이며 길이 3 ~ 4 mm, 지름 1 mm 이하이고 바깥면은 황갈색 ~ 어두운 갈색으로 많은 세로주름이 있으며 윗부분은 수축되어 가느다란 부리 모양이다. 끝은 회백색의 둥근 고리 모양으로 퍼졌으며 아랫부분은 약간 뽕족하며 열매꼭지에 착생했던 자국이 있다. 열매껍질은 얇고 섬유성이며 씨껍질은 얇고 투명하고, 떡잎은 2장이고 흰색에 가까우며 약간 유성이다.

이 약은 향기가 약간 있으며 맛은 약간 쓰다.

순도시험 1) 중금속 가) 납 5 ppm 이하.

나) 비소 3 ppm 이하.

다) 수은 0.2 ppm 이하.

라) 카드뮴 0.3 ppm 이하.

2) 잔류농약 가) 총 디디티(p,p'-DDD, p,p'-DDE, o,p'-DDT 및 p,p'-DDT의 합계) 0.1 ppm 이하.

나) 디엘드린 0.01 ppm 이하.

다) 총 비에이치씨(α, β, γ 및 δ -BHC의 합계) 0.2 ppm 이하.

라) 알드린 0.01 ppm 이하.

마) 엔드린 0.01 ppm 이하.

건조감량 14.0 % 이하.

회 분 8.0 % 이하.

엑스함량 물은에탄올엑스 5.0 % 이상.

저 장 법 밀폐용기.