

석위
(石韋)
Pyrrosiae Folium

석란(石欄)

이 약은 석위 *Pyrrosia lingua* (Thunberg) Farwell, 애기석위 *Pyrrosia petiolosa* Ching 또는 세뿔석위 *Pyrrosia tricuspis* Tagawa (고란초과 Polypodiaceae)의 잎이다.

성 상 석위 이 약은 잎으로 넓은 피침형 또는 달걀모양 피침형으로 길이 10 ~ 26 cm, 너비 1 ~ 3 cm이다. 잎이 두껍고 잎의 양끝이 좁고 두꺼우며 겉면은 황록색으로서 털이 없으나 뒷면은 갈색이 도는 성상모가 촘촘히 나며 주맥이 뚜렷하게 도드라진다. 연한 노란색의 포자낭이 덮여 있다.

애기석위 이 약은 타원형 ~ 긴타원형이고 길이 3 ~ 7 cm이다. 잎자루는 잎보다 길며 포자낭군이 융합하지만, 포막은 없다.

세뿔석위 이 약은 잎이 3 ~ 5 개로 창살같이 갈라진다.

이 약은 거의 냄새가 없고 맛은 약간 쓰다.

순도시험 1) 중금속 가) 납 5 ppm 이하.

나) 비소 3 ppm 이하.

다) 수은 0.2 ppm 이하.

라) 카드뮴 0.3 ppm 이하.

2) 잔류농약 가) 총 디디티(총 DDT : p,p'-DDD, p,p'-DDE, o,p'-DDT 및 p,p'-DDT의 합계) 0.1 ppm 이하.

나) 디엘드린(Dieldrin) 0.01 ppm 이하.

다) 총 비에이치씨(총 BHC : α,β,γ 및 δ-BHC의 합계) 0.2 ppm 이하.

라) 알드린(Aldrin) 0.01 ppm 이하.

마) 엔드린(Endrin) 0.01 ppm 이하.

3) 이산화황 30 ppm 이하.

건조감량 10.0 % 이하.

회 분 9.0 % 이하.

산불용성회분 5.0 % 이하.

엑스함량 묽은에탄올엑스 16.0 % 이상.

저 장 법 밀폐용기.