

여로
(藜蘆)

Veratri Rhizoma Et Radix

여로두(藜蘆頭)

이 약은 참여로 *Veratrum nigrum* Linné var. *ussuriense* Loes. fil. 또는 박새 *Veratrum oxysepalum* Turcz. (백합과 Liliaceae)의 뿌리줄기와 뿌리이다.

성 상 이 약은 뿌리줄기와 뿌리로 뿌리줄기는 짧고 굵은 원기둥모양이고 길이 35 ~ 50 cm, 지름 1.0 ~ 15 mm이다. 뿌리줄기의 바깥면은 엽초가 썩어서 남은 섬유로 싸여 있고 흑갈색 ~ 적갈색을 띠고 있다. 위쪽에는 잎의 잔기가 남아 있고 그 아래쪽에는 굵은 수염뿌리가 있고 길이 3 ~ 6 cm이다.

이 약은 특유한 자극성 냄새가 있고 맛은 약간 쓰며, 분말은 강한 재채기를 일으킨다.

확인시험 이 약의 가루 0.5 g에 묽은 초산 10 mL를 넣어 수욕에서 가온하여 여과한 여액 20 mL에 마이야시액 한 방울을 넣으면 황백색 침전을 생성한다.

순도시험 1) 이물 이 약은 줄기 등의 이물이 5.0 % 이상 섞여 있어서는 안된다.

2) 중금속 가) 납 5 ppm 이하.

나) 비소 3 ppm 이하.

다) 수은 0.2 ppm 이하.

라) 카드뮴 0.3 ppm 이하.

3) 잔류농약 가) 총 디디티(총 DDT : p,p'-DDD, p,p'-DDE, o,p'-DDT 및 p,p'-DDT의 합계) 0.1 ppm 이하.

나) 디엘드린(Dieldrin) 0.01 ppm 이하.

다) 총 비에이치씨(총 BHC : α,β,γ 및 δ-BHC의 합계) 0.2 ppm 이하.

라) 알드린(Aldrin) 0.01 ppm 이하.

마) 엔드린(Endrin) 0.01 ppm 이하.

4) 이산화황 30 ppm 이하.

건조감량 12.0 % 이하 (6시간).

회 분 7.0 % 이하.

산불용성회분 2.0 % 이하.

엑스함량 **푸른에탄올엑스** 15.0 % 이상.

저장법 밀폐용기.